



**ONKO GYN s.r.o.**

Masarykovo náměstí 20/37

702 00 Moravská Ostrava

**www.onko-gynekologie.cz, e-mail: onkogyn@email.cz, tel: 732 610 425**

## INFORMOVANÝ SOUHLAS S VÝKONEM EXCIZE LOŽISKA V CELKOVÉ ANESTEZII

Vážená paní,

na základě klinického nebo mikroskopického vyšetření bylo vysloveno podezření na patologii zevních rodidel a byl Vám doporučen chirurgický zákrok. Chtěli bychom Vám poskytnout informace o plánované operaci, abyste mohla s tímto postupem vyslovit souhlas.

### CO JE EXCIZE

Excize je operace, u níž se skalpelem nebo speciální elektrokoagulační kličkou vytíná patologicky změněná tkáň, která je pooperačně podrobena mikroskopickému vyšetření. Většinou se po resekci provádí sešití kožního defektu.

### PŘEDOPERAČNÍ A OPERAČNÍ POSTUP

Pět hodin před operací nesmíte nic jíst ani pít, k operaci přijdete s doprovodem, s sebou je dobré si vzít vlastní noční košilku. Lékař anesteziolog Vám zajistí žílu, do které před operací podá uspávací a bolest tišící látku, která odstraňuje bolest operačního výkonu a zpracování bolestivých podnětů v mozku. Během této anestezie provádí operatér operační výkon, který při nekomplikovaném průběhu trvá 5–10 minut.

### POOPERAČNÍ POSTUP

Po operaci budete sledována na pooperačním dospávacím lůžku a po kontrole lékařem budete moci v doprovodu odejít.

Hojení trvá 2–4 týdny, je provázeno bolestivostí v místě operace a zvýšenou vodnatou sekrecí z podkoží. Po dobu hojení, minimálně do kontroly operatérem, která proběhne za 2–3 týdny, musíte dodržovat určitá omezení. Nesmíte se koupat ve vaně, v bazénu, nesmíte mít pohlavní styk a provozovat činnosti, které zvyšují prokrvení pánve, žádný sport, běhání, skákání, jízda na kole, zvedání těžkých břemen. Pokud nemáte fyzicky náročné zaměstnání, není nutná pracovní neschopnost, v opačném případě je vhodné se domluvit se svým registrujícím gynekologem nebo praktickým lékařem.

### JAKÉ JSOU MOŽNÉ KOMPLIKACE A RIZIKA

Každý lékařský zákrok s sebou nese možná rizika, která se v tomto případě pohybují v řádu 1–2 procent. Z anesteziologických komplikací to může být ospalost, malátnost, zhoršení koordinace pohybu přetrvávající 24 hodin po výkonu. Alergická reakce se může objevit po aplikaci jakéhokoliv léčiva či desinfekčního prostředku. Z operačních komplikací se může jednat o poranění okolních orgánů, které si vyžádá hospitalizaci. Z komplikací v průběhu hojení se může jednat o nutnost užívání antibiotik při zánětlivých komplikacích a prodloužené hojení při předčasném uvolnění stehů.

### JAKÉ JSOU ALTERNATIVY VÝKONU

Žádné jiné vyšetření nemůže poskytnout reprezentativní vzorek pro mikroskopické vyšetření a vyloučení onkologického onemocnění.

Prohlašuji, že mi byl vysvětlen důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Měla jsem možnost se zeptat na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržela jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměla.

**S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.**

VYSVĚTLUJÍCÍ POHOVOR PROVEDL

JMÉNO .....

R. Č. ....

PODPIS .....

91	<b>ONKO GYN s.r.o.</b>
205	MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.
001	<b>ONKO GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE</b>
	Masarykovo náměstí 20/37
	702 00 Moravská Ostrava
	tel.: 732 610 425